

von *Cec. onobrychidis* Bremi nur sehr kurze Stiele an den Geisselgliedern zeigen, welche bei oberflächlicher Betrachtung leicht übersehen werden können.

Die Annahme Dr. Löw's l. c. pag. 17 *in nota*, dass *Cec. Giraudi* Frnfd. eine von *Cec. onobrychidis* Bremi verschiedene Art sei, entfällt, nachdem er letztere Art verkannt hat, von selbst.

Schliesslich möchte ich noch auf eine irrthümliche Angabe in der *Synopsis Cecidomyidarum* von Bergenstamm und P. Löw aufmerksam machen, derzufolge (pag. 45) die Larven von *Cec. Giraudi* einzeln in den Fiederblättchen von *Astragalus austriacus* leben sollen, während Frauenfeld l. c. pag. 1234 ausdrücklich erwähnt, dass er 2—4 Larven dieser Art in einem Fiederblättchen der genannten Pflanze getroffen habe.

Note sur le genre *Euceratomyia* Willist.

Par J. M. F. Bigot à Paris.

Monsieur S. W. Williston (New-Haven, Connecticut, N.-Amer.) a publié dans le *Wiener Entomol. Zeit.* (III. Jahrg. VI. Heft, 1884) un gen. des Syrphides (pag. 185, Fig.) *Euceratomyia*, qui n'est autre que mon propre gen. *Merapioidus* *) olim (v. Soc. Ent. de France, *Bullet. bimens.* 1879, no. 6, pag. 64; — v. également: Soc. Ent. de France, *Annales*, 1883, pag. 253, tableau synoptique des Syrphides: *Merapioides*). J'ai publié également (*Bullet. bimens.* l. cit. 1877, no. 8, pag. 102) un gen. *Euceromys* (*Stratiomyides*).

*) Es muss Wunder nehmen, dass Williston bei Aufstellung seiner Gatt. *Euceratomyia* der Gatt. *Merapioidus* Big. nicht gedacht hat, nachdem er sie in seiner „*Contribution to a Monograph of the N. Amer. Syrphidae*“ in *Proc. Amer. Philos. Soc.* Vol. XX. 1882, pag. 331, in den analytischen Tabellen berücksichtigt hatte.

J. Mik.